

FOTO TARTUFI

- *Tuber Magnatum Pico*
- *Tuber melanosporum Vitt.*
- *Tuber albidum Pico o Tuber borchii Vitt.*
- *Tuber brumale Vitt.*
- *Tuber brumale varietà moscatum De Ferry*
- *Tuber aestivum Vitt.*
- *Tuber. uncinatum Chatin Vitt.*
- *Tuber macrosporum Vitt.*
- *Tuber mesentericum Vitt*

Tuber Magnatum Pico



Tartufo Bianco Pregiato (Tuber Magnatum Pico)

Noto volgarmente come "Tartufo bianco pregiato", "Rapone", "Tartufo bianco di Acqualagna.

Carpoforo tuberiforme -globoso, negli esemplari cresciuti in terreni sciolti, oppure compresso o sinuoso, in quelli cresciuti in terreni tenaci.

Peridio di colore giallognolo o ocraceo pallido, con sfumature verdognole e con superficie liscia.

Gleba di colore variabile a seconda del grado di maturazione e degli alberi con i quali vive in simbiosi, per lo più nocciola o rosata per poi diventare fuliginoso-rossiccia o rossiccia.

Vene biancastre, sottilissime e sinuose che scompaiono con la cottura.

Aschi privi di peduncolo o sub-pedunculati, globosi, di varie dimensioni (65-100 x 40-70 micron), contenenti 1-3 spore talora 4.

Spore ovoidali e anche sferiche di colore bruno pallido di dimensioni variabili (30-40 x 25-40 micron) e con ornamentazione reticolato-alveolata a maglie molto larghe.

Emana un forte odore caratteristico superiore a qualsiasi altra specie di tartufi.

Matura in autunno fino all'inizio dell'inverno.

Tuber melanosporum Vitt.



Tuber melanosporum Vitt. (Tartufo nero pregiato)

Noto volgarmente come; "Tartufo nero di Norcia o di Spoleto"; o "nero pregiato" o "nero dolce", ha dimensioni che variano [da una noce a quella di una grossa arancia].

Carpoforo di forma rotondeggiante piuttosto regolare, talora irregolare se cresciuto in terreni molto ricchi di scheletro.

Peridio nero aderente alla gleba, talora con [zonature] rugginose, con verruche di media grandezza (3-5 mm) e di forma piramidale a base quadrata, pentagonale o esagonale, con il vertice smussato o depresso. Gleba chiara negli esemplari giovani, nero porpora o nero-violacea a maturità.

Vene bianche, fitte, strette, a contorni definiti, che all'aria diventano bruno - rossicce, circondate da due bande traslucide.

Aschi tondeggianti, talora sub-pedunculati, di varie dimensioni (90-130 x 70-100 micron), contenenti 1-6 spore.

Spore ellittiche, brune a maturità di varie dimensioni (30-50 x 25-30 micron), con superficie ricoperta di fitti e corti aculei rigidi.

Matura da dicembre a marzo. Emana un profumo intenso e gradevole.

Tuber albidum Pico o Tuber borchii Vitt.



Tuber albidum Pico o Tuber borchii Vitt.(Bianchetto o Marzuolo)

Noto volgarmente come; "Bianchetto" o "Marzuolo".

Carpoforo di forma globosa piuttosto regolare, senza prominente basale.

Peridio liscio, che si distacca dalla sottostante gleba, di colore, biancastro negli esemplari giovani, bruno con maculature rugginose a maturazione.

Gleba dapprima biancastra, successivamente fulva e poi bruno violacea.

Vene bianche che tendono a imbrunire leggermente, grossolane ed anastomizzate. Aschi globosi di varie dimensioni (110-70 x 65-85 micron), provviste di un breve peduncolo, contenente 1-4 spore.

Spore ovato-globose di dimensioni molto variabili (30-45 x 20-35 micron), giallo-brunastre, con ornamentazione reticolato-alveolata a maglie molto fitte.

Matura da gennaio ad aprile, Emana un odore intenso, decisamente agliaceo .

Tuber brumale Vitt.



Tuber brumale Vitt. (Tartufo invernale o Trifola nera)

Noto volgarmente come "tartufo nero invernale" o "Trifola nera".

Ha dimensioni che vanno da quelle di una nocciola a quelle di un uovo di gallina.

Carpoforo globoso, talvolta irregolare se cresciuto in un terreno molto ricco di scheletro.

Peridio nero o nero ferruginoso a maturazione, con verruche piramidali a base pentagonale o esagonale e vertice smussato, larghe 2-4 mm. e poco sporgenti, di aspetto più rugoso del Tuber melanosporum.

Gleba chiara negli esemplari giovani, nera ferruginosa a maturità

Vene biancastre anche all'aria, larghe e più rade di quelle del Tuber melanosporum.

Aschi a sacchi privi di peduncolo, di varie dimensioni (65-100 x 50-70 micron), contenenti 3-6 spore.

Spore ellittiche, (20-40 x 16-28 micron), ricoperte di numerosi aculei abbastanza lunghi (4-6 micron).

Matura da gennaio

Tuber brumale varietà moscatum De Ferry



tuber brumale varietà moscatum De Ferry (Tartufo Moscato o Tartufo di Campo)

Noto volgarmente come "Tartufo moscato", "Tartufo nero di campo", ha dimensioni che raggiungono al massimo quelle di un uovo di gallina. E' simile al Tuber brumale dal quale differisce per il colore più chiaro della gleba e per il forte odore di muschio. Matura nei mesi di gennaio - marzo.

Tuber aestivum Vitt.



Tuber aestivum Vitt.(Scorzzone o Tartufo D'Estate)

Noto volgarmente come; "Tartufo

d'estate", "Scorzzone", "Maggengo", "Maggiolo", o, "Statereccio".

Carpoforo irregolare tondeggianti, nero-bluastro, con verruche larghe 4-10 mm e alte 1,5-3 mm., di forma piramidale a base pentagonale o esagonale, vertice generalmente depresso dal quale partono creste radiali in rilievo, facce laterali solcate da piccolissime screpolature longitudinali parallele tra loro. Gleba biancastra negli esemplari giovani, bruno chiaro a maturità. Vene biancastre, immutabili, sottili, anastomizzate che scompaiono con la cottura. Aschi globosi, brevemente pedunculati, di varie dimensioni (80-100 x 50-80 micron) contenenti un numero molto variabile di spore da (1-6), con ornamentazione reticolato-alveolata irregolare.

Matura da maggio a dicembre.

Emana un debole profumo.

Tuber. uncinatum Chatin Vitt.



Tuber. uncinatum Chatin Vitt. (Tartufo uncinato)

Noto volgarmente come; "tartufo uncinato"; "tartufo nero di Fragno"; "tartufo grigio di Borgogna"; simile al Tuber aestivum dal quale si differenzia per i seguenti caratteri:

Peridio di piccole e medie dimensioni, prive di screpolature longitudinali. Gleba di colore bruno-scuro a maturità. Vene numerose e molto marcate. Spore ellittiche ricoperte da aculei ricurvi a-uncino.

Matura nel periodo autunno-inverno. Emanava un odore più intenso e gradevole del Tuber aestivum.

Forma pianelli poco evidenti.

Tuber macrosporum Vitt.



Tuber macrosporum Vitt. (tartufo nero liscio)

Noto volgarmente come; "tartufo nero liscio".

Carpoforo, globoso, gibboso, e talora provvisto di tubercoli.

Peridio nero con macchie rugginose, ricoperto di verruche poligonali, difformi, appiattite, più piccole di quelle presenti nel *Tuber aestivum*, nel *Tuber melanosporum* e nel *Tuber brumale*.

Gleba dapprima biancastra e poi bruno-porpora.

Vene esili, biancastre, che diventano bruno-pallide all'aria.

Aschi subglobosi, sub pedunculati, di varie dimensioni (90-140 x 70-100 micron), contenenti (1-3) spore.

Spore ellittiche di grandi dimensioni (40-80 x 30-55 micron), rosso brune, con ornamentazione reticolato-alveolata a maglie irregolari.

Matura da ottobre a dicembre.

Tuber mesentericum Vitt.



Tuber mesentericum Vitt. (tartufo nero ordinario di Bagnoli)

Noto volgarmente come; "Tartufo nero ordinario di Bagnoli";

Carpoforo globoso, provvisto di una cavità centrale profonda che si apre sulla parte basale, per cui in sezione assume un aspetto reniforme.

Peridio molto nero o brunastro o bluastro, con verruche poligonali, appiattite, senza fossa alla base.

Gleba dapprima biancastra poi bruna-purpurea.

Vene numerose, biancastre, labirintiformi.

Aschi sub - pedunculati contenenti 1-3 spore.

Spore ellittiche o sub - globose, con ornamentazione reticolato - alveolare irregolare.

Matura da ottobre a gennaio.

Emana un caratteristico odore che ricorda lo iodoformio.