








Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022


Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Sottosistema 7.1 "Piani di tutela e gestione delle AIN Natura 2000"

PIANO DI GESTIONE

ZSC IT5310029

"Furio"



QC-09

CARTA

GEOSINFITOSOCIOLOGICA

Scala: 1 : 10.000

Data: Febbraio 2024



Ente gestore:

Riserva Naturale del Furio

Provincia di Perugia e Urbino

UM del Catina e Nerone

UM dell'Alta Valle del Metauro






Direttore tecnico: Dott. Cristiano Spilghe

Coordinamento tecnico-scientifico: Dott. Silvia Carletti

Adottata:

Approvata:



Unione Europea

Programma Nazionale

Lo Sviluppo Rurale

2014-2020

Il Piano di Sviluppo Rurale

è finanziato dalla

Unione Europea

e dallo Stato Italiano

Legenda

 ZSC IT5310029

Geosigmeti

-  Elemento di paesaggio vegetale del calcare massiccio del piano bioclimatico mesomediterraneo delle gole rupestri dell'Appennino centrale
-  Elemento di paesaggio vegetale dei substrati calcarei del piano bioclimatico mesotemperato inferiore variante submediterranea
-  Elemento di paesaggio vegetale delle alluvioni terrazzate del piano bioclimatico mesotemperato inferiore
-  Elemento di paesaggio vegetale dei substrati calcareo-marnosi con noduli di selce alternati a marne e argille siltose del piano bioclimatico mesotemperato inferiore dei rilievi pre-appenninici del carpio nero
-  Elemento di paesaggio vegetale del calcare massiccio del piano bioclimatico mesotemperato delle gole rupestri dell'Appennino centrale
-  Elemento di paesaggio vegetale dei substrati calcarei del piano bioclimatico mesotemperato superiore
-  Elemento di paesaggio vegetale delle pianure alluvionali attuali e recenti delle aste fluviali
-  Geosigmeto non presente

Sinfitosociologia

-  Serie climatofila, subacidofila del carpio nero. Anemone triflorae-Ostrya carpinifoliae S
-  Serie climatofila, neutrobasilica del carpio nero. Asparago acutifolii-Ostrya carpinifoliae asparago acutifolii S
-  Serie climatofila, neutrobasilica del carpio nero. Scutellario columnae-Ostrya carpinifoliae violi reichenbachianae S
-  Serie climatofila, neutrobasilica del faggio. Lathryo veneti-Fago sylvaticae lathryo veneti S
-  Serie edafo-verofila, subacidofila del quercia di virgilio. Roso sempervirentis-Quercus virgilianae erico arboreae S
-  Serie edafo-verofila rupestre, neutrobasilica del leccio. Cyclaminio hederifolii-Quercus ilicis cyclaminio hederifolii S
-  Serie edafo-verofila, neutrobasilica del leccio. Cephalantho longifoliae-Quercus ilicis lathryo veneti S
-  Serie edafo-verofila, neutrobasilica della roverella. Cytiso sessilifoliae-Quercus pubescentis S
-  Serie edafo-verofila, basilica del quercia di virgilio. Roso sempervirentis-Quercus virgilianae cotino coggygriae S
-  Serie edafo-mesofila, del pioppo nero. Salici albae-Populo nigrae populo nigrae S
-  Serie edafo-mesofila, neutrobasilica del faggio e carpio bianco. Lathryo veneti-Fago sylvaticae carpio betuli S
-  Serie edafo-igrofila, neutrofila del salice bianco. Rubo ulmifolii-Salicetum albae
-  Serie edafo-igrofila, del pioppo bianco. Populo albae S
-  Serie edafo-igrofila, neutrobasilica del nocciolo. Carpio betuli-Corylo avellanae S
-  MICROGEOSIGMETO -
-  MICROGEOSIGMETO - Vegetazione boschiva ripariale a mosaico con pioppo nero, pioppo bianco e salice bianco.